

四庫全書

子部

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四十

明薛己訂

婦人良方

坐月門

妊娠疾病既明須知
坐月避忌故以次之

產寶方周頰序第一

頰聞至靈者人最重者命人皆知命之重而不知養
命之方以致年未衰邁疾病攻奪倉卒尋醫多致有

誤况婦人病惟產難為急子母命懸片時故產二三胎者臟腑未衰血氣未減疾病易治若產育過多復自乳子血氣愈傷尤難治若產後血氣未復胃氣益傷諸症蜂起此古人所以專著產乳方論余故徧採產寶等方兼拾咎氏之遺作為論說萃為一編刊行于世以救危急云時丁巳歲秋八月吉日周題謹序

將護孕婦論第二

凡妊娠至臨月當安神靜慮時當步履不可多睡飽食

過飲酒醴雜藥宜先貼產圖依位密鋪床帳預請老練
穩婆備辦湯藥器物欲產時不可多人喧闐愴惶但用
老婦二人扶行及凭物站立若見漿水腰腹痛甚是胎
離其經令產母仰卧令兜轉身頭向產門用藥催生坐
草若心煩用水調服白蜜一匙覺飢吃糜粥少許勿令
饑渴恐乏其力不可強服催藥早於坐草慎之

愚按前論當慎守之此先哲好生之德防患於未萌
者也仁哉

滑胎例第三

凡妊娠十月宜服滑胎湯藥

滑胎枳殼散令胎瘦產易河陽公主每產累日不下南

山道人進此方

商州枳殼

麩炒二兩

粉草

炒一兩

右為末每服二錢空心沸湯調日三服凡孕六七月
宜服之溫隱居加當歸廣木香各等分

易產兼治諸疾下氣寬膈

枳殼

麩炒
五兩

甘草

一兩
半

香附子

三兩
炒
去毛

右為末每服二錢用白湯調服

內補丸治妊婦衝任脉虛補血安胎

熟地黄

二兩用生
地酒
拌蒸熟
拌膏

當歸

一兩
炒
為末

右為末和丸梧子大每服三四十丸温酒或滾湯下

許學士云大率妊娠唯在抑陽助陰然胎前藥唯惡

羣隊陰陽錯雜別生他病唯枳殼散所以抑陽四物

湯所以助陰爾然枳殼散其味多寒若單服恐致胎

寒腹痛更以內補丸佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也

易產滑胎車前子為末或酒或飲服寸匙詩云芣苢能令婦人樂有子矣陸機註云治婦人產難愚詳孔子序詩云樂然則生易於生育即此謂也

神寢丸 臨月服之神效

蕪州施少卿方
蕪州徐太丞傳

通明乳香

半兩
研積殼

一兩
麩炒

右為末煉蜜丸梧子大每服三十九空心溫酒下

榆白皮散 治妊娠滑胎易生

榆白皮 甘草各二兩 葵子一兩

右為末每服五錢水煎

孕及九月將產猪肚一具煮爛徐徐自食盡易產

保元散 治寬氣進食瘦胎易產或居處失宜頓仆胎

動若胎痛胎漏兼服佛手散見通用方

香附四兩 山藥二兩 砂仁一兩 木香四兩 粉草一兩 益智 紫蘇

葉各半兩

右為末每服二錢白湯調下

神寢丸枳殼散見前此三藥入月宜常服

保產無憂散 治妊婦身居安逸口厭甘肥憂樂不常
食物不節致胞胎肥厚根蒂堅牢入月服之則易生
矣

當歸 川芎 白芍藥 枳殼麩炒 乳香各三錢

木香 甘草 血餘即髮灰以獷猪心
血和之各一錢半

右為末每服三錢水煎日二服神效

月空方位例第四

出太平聖惠方
外臺秘要同

正月 三月 五月 七月 九月 十一月 在丙壬

二月 四月 六月 八月 十月 十二月 在甲庚

逐月安產藏衣忌向方位第五


凡安產藏衣方位並於卧閣内分布太平聖惠方云凡
妊婦初入月便寫產圖一本以朱書某月某日空貼在
某位如正月在丙壬可於壬位安產婦床帳丙位藏衣
之類貼產房北壁若值閏月只看節氣用之又云每

月產圖有雷公招搖運鬼力士天狗軒轅大時咸池豐隆吳時白虎大夫天候狂虎凡此十三神並從月建易其位所謂月空者按內經云月廓空無寫玉冰注云論月輪中空日也即非十三神之數今太平聖惠方以六陽月在丙壬以六陰月在甲庚正如外臺所言正月在丙壬至十二月在甲庚之類其理一也但外臺言之詳聖惠言之簡今人多從其簡或云凡逐月安產藏衣並向月德月空方位所有十三神殺並從節氣更換若

交次月節便作次月用書產圖者非也假如正月十四
日立春若姪婦十三日乳卧豈可作去年十二月用必
依月分用之乃是若依節氣使換則天德月德所在差
矣然月空與任謂之中天空頗相類議者以為天空者
非十三神之數蓋課中有天乙貴人其位無可與對者
故此空是謂天空值此神百事不宜止宜安產婦床
帳藏衣之類耳集聖歷云天德正月在丁二月在坤
三月在壬四月在辛五月在乾六月在甲七月在癸

八月在艮九月在丙十月在乙十一月在巽十二月在
天又堪輿歷有遊年白虎殺神在太歲後一辰如太歲
卯則白虎在寅餘做此推之若產及藏衣犯之則母子
皆不利

王子亨云難產逆生論稱犯一切神殺固有是理然
亦有自然難產免自逆生者及有產腸俱下者產已
則復如故此非疾病所致血氣所主天下之理蓋有
不可窮詰者亦宜知之



安產藏衣十三神吉凶方位

藏安運雷招軒威豐天狂天大白

衣產鬼公猛較池隆狗虎侯夫虎

吉吉力 大 吳

方方士 時 時

正月 壬丙艮寅寅卯辰辰午申酉戌

二月 坤_寅甲乾亥卯子丑未巳酉己戌亥

三月 丙壬坤申辰酉戌戊午子寅亥子

四月 甲庚 巽巳巳午未丑未酉亥子丑

五月 丙壬 艮寅午卯辰申子申丑寅

六月 庚甲 乾亥未子丑未酉卯巳寅卯

七月 丙壬 坤申申酉戌戌戌子寅卯辰

八月 庚甲 巽巳酉午戌丑亥卯亥辰巳

九月 丙壬 艮寅戌卯辰辰子午申巳午

十月 庚甲 乾亥亥子丑未丑卯巳午未

十一月 壬丙 坤申子酉戌戌寅午寅未申

十二月庚申與己丑午未丑卯酉亥申酉

推婦人行年法第六

生氣方 產婦宜向之坐卧及產帳向之開門大吉

反支月 遇此月即鋪灰上用牛皮或馬驢皮訖鋪草
勿令惡血汚地吉

禍害月 不得於其上產又不得向之二便避之大吉
絕命方 不得於其上產又不得向之大小便避之大

吉

懸尸日 遇此日產不得攀繩宜懸馬轡攀之大吉
閉肚方 臨月至滿月並不得向之大小便及棄不

淨之水謹之吉

八疰方 產帳不得向之開門忌之大吉

生反視絕懸閉入產時宜

氣支害命尸肚疰母宜聚

方月方方日方方

十三歲

行年在庚申坤

正七月

離巽

辰戌日

在正西偏北辛 在正東偏北甲 黃色衣西南首

西南方黃衣師看產

十四歲行年在巳未

二月二十八日坤兌郊酉

在正北偏西壬 在正北偏東癸 赤色衣正南首

正南方赤衣師看產

十五歲行年在戊午坎

三月九日乾艮丑未

在正東偏北甲 在正北偏西壬 黑色衣正北首

正北方黑衣師看產

十六歲行年在丁巳震四月艮乾丑未

在正東偏北甲 在正西偏北辛 青色衣正東首

正東方青衣師看產

十七歲行年在丙辰艮五月震艮子午

在正東偏南乙 在正南偏南庚 黃色衣東北首

東北方黃衣師看產

十八歲行年在乙卯乾六月坎震巳亥

在正南偏東丙 在正南偏西丁 白色衣西北首

西北方白衣師看產

十九歲行年在甲寅兌

正七 巽離 辰戌

在正南偏西丁 在正南偏東丙 白色衣正西首

正西方白衣師看產

二十歲行年在癸丑巽

二八 兌坤 卯酉

在正西偏南庚 在正東偏南乙 青色衣東南首

東南方黃衣師看產

二十一歲行年在壬子坤

三九 離巽 寅申

在正西偏北辛 在正東偏北甲 黃色衣西南首

西南方黃衣師看產

二十二歲行年在辛亥離

四十日坤兌 丑木

在正北偏西壬 在正北偏東癸 赤色衣正南首

正南方赤衣師看產

二十三歲行年在庚戌坎

五十一日乾艮 子午

在正北偏東癸 在正北偏西壬 黑色衣正北首

正北方黑衣師看產

二十四歲行年在巳酉震

六十艮乾巳亥
二月

在正東偏北甲

在正西偏北辛

青色衣正東首

正東方青衣師看產

二十五歲行年在戊申艮

正七震坎辰戌
月

在正東偏南乙

在正西偏南庚

黃色衣東北首

東北方黃衣師看產

二十六歲行年在丁未乾

二八坎震卯酉
月

在正南偏東丙

在正南偏西丁

白色衣西北首

西北方白衣師看產

二十七歲行年在丙午兌

三九

巽離

寅申

在正南偏西丁 在正南偏東丙 白色衣正西首

正西方白衣師看產

二十八歲行年在乙巳巽

四十

兌坤

丑未

在正西偏南庚 在正東偏北乙 青色衣東南首

東南方青衣師看產

二十九歲行年在甲辰坤

五十

離巽

子午

在正西偏北辛 在正東偏南甲 黃色衣西南首

西南方黃衣師看產

三十歲行年在癸卯離

六十坤兌
二月日 巳亥

在正北偏西壬 在正北偏東癸 赤色衣正南首

正南方赤衣師看產

三十一歲行年在壬寅坎

正七
乾艮辰戌
日

在正北偏東癸 在正北偏西壬 黑色衣正北首

正北方黑衣師看產

三十二歲行年在辛丑震

二八月艮乾
卯酉

在正東偏北甲

在正西偏北辛

青色衣正東首

正東方青衣師看產

三十三歲行年在庚子艮

三九月震坎
寅申

在正東偏南乙

在正西偏南庚

黃色衣東北首

東北方黃衣師看產

三十四歲行年在巳亥乾

四十月坎震
丑未

在正南偏東丙

在正南偏西丁

白色衣西北首

西北方白衣師看產

三十五歲行年在戊戌元

五十一月 吳離子午日

在正南偏西丁 在正南偏東丙 白色衣正西首

正西方白衣師看產

三十六歲行年在丁酉吳

六十二月 元坤巳亥日

在正西偏南庚 在正東偏南乙 青色衣東南首

東南方青衣師看產

三十七歲行年在丙申坤

正七月 離吳辰戌日

在正西偏北辛 在正東偏東甲 黃色衣西南首

西南方黃衣師看產

三十八歲行年在乙未離二八月坤兌卯酉

在正北偏西壬 在正北偏東癸 赤色衣正南首

正南方赤衣師看產

三十九歲行年在甲午坎三九月乾艮寅丑

在西北偏東癸 在正北偏西壬 黑色衣正北首

正北方黑衣師看產

四十歲行年在癸巳震

四月

艮乾

丑未日

在正東偏北甲

在正西偏北辛

青色衣正東首

正東方青衣師看產

四十一歲行年在壬辰艮

五月

震坎

子午日

在正東偏南乙

在正西偏南庚

黃色衣東北首

東北方黃衣師看產

四十二歲行年在辛卯乾

六月

坎震

巳亥日

在正南偏東丙

在正南偏西丁

白色衣西北首

西北方白衣師看產

四十三歲行年在庚寅元

正七 巽離 辰戌

在正南偏西丁 在正南偏東丙 白色衣正西首

正西方白衣師看產

四十四歲行年在巳丑巽

二八 兌坤 卯酉

在正西偏南庚 在正東偏南乙 青色衣東南首

東南方青衣師看產

四十五歲行年在戊子坤

三九 離巽 寅申

在正西偏北辛 在正東偏北甲 黃色衣西南首

西南方黃衣師看產

四十六歲行年在丁亥離

四月坤兌

丑未日

在正北偏西壬 在正北偏東癸 赤色衣正南首
正南方赤衣師看產

四十七歲行年在丙戌坎

五月乾艮

子午日

在正北偏東癸 在正北偏西壬 黑色衣正北首
正北方黑衣師看產

四十八歲行年在乙酉震

六十 艮乾 巳亥
二月

在正東偏北甲 在正西偏北辛 青色衣正東首

正東方青衣師看產

四十九歲行年在甲申艮

正七 震坎 辰戌
月 日

在正東偏南乙 在正西偏南庚 黃色衣東北首

東北方黃衣師看產 坐產時更用後法

體玄子借地法第七

東借十步

西借十步

南借十步

北借十步

上借十步

下借十步

辟方之中四十餘步安產借地或有穢污或有東海神
王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有
日遊將軍白虎大夫遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天
符地軸入地十丈令地空間產婦某氏安居無所妨碍
無所畏忌諸神擁護百邪速去急急如律令勅

前項借地法於

入月一日朱書一本貼產婦房
內牆辟上更不須避忌神殺也

禁草法第八 鋪草及氈褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵母
子相生俱蔑鐵急急如律令

禁水法第九 欲產時貯水呪曰

南無三寶水

水在井中為井水 水在河中為河水

水在器中為淨水 水在法中為真水

自知非真莫當真水

以淨持濁 以正治邪 日遊月殺 五士將軍

青龍白虎 朱雀玄武 招搖天狗 軒轅女媧

天吞地吞 懸尸閉肚 六甲禁諱 十二神王

土符伏神 各安所在 不得動靜 不得忌干

若有動靜 若有忌干 施以神呪 當攝汝形

阿佉尼阿毗羅莫多梨娑地梨娑訶

八月預備藥物第十

愚按前所預備內佛手保氣枳殼榆皮黑神大聖慈
石七散神寢保生理中三九催生黑虎二丹及催生

神符又葵子生地黃羌活竹茹烏梅雌雄石燕甘草海
馬銜鐵大棗陳皮薑錢黑豆白蜜無灰酒童子小便酸
醋白米湯瓶鍋鈿斷臍線剪之類可謂周恤之至矣內
花蕊石散為血入胞衣脹大不能下或惡露上攻不能
甦醒佛手散治血虛之危症加味芎歸湯治交骨不開
單麻子治胎衣不能上下失笑散治惡露腹痛不省人
事蜡油調滑石塗入產門為滑胎之藥清魂散治血暈
等症平胃散朴硝水銀為腐化死胎之劑八珍湯補血

氣虛損已上諸方皆為緊要之藥必不可缺其斷臍帶
先用線近臍札緊帛裏咬臍如天氣風寒或難產母子
勞傷元氣者先札臍帶以油紙揩燒斷此又為迴生起
死之要法也故治者當審其宜不可槩信而用之

催生靈符第十一

靈符宜以水飛硃砂書之貼於房內北壁上至坐蓐之時
將符以針劄就盞內化之溫水調服

治產難橫生逆產胞衣不下靈符見後

出聖惠方局方同

麗

出

月月月月
月月月月
月月月月
月月月月

月月月月
月月月月
月月月月

子公光
子公光
麗

不安穩
朱書貼產婦
處北壁上

麗

覺不安穩
朱書貼枕上

子馬
麗

橫生朱砂
書此符以
順水吞下

此云
儼儼儼儼

此四符八月一日
墨書鞋底上密安
產婦蓆蓐下勿令
人知

扉
庸
豐
庸


此三符過產難以
墨書吞之

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

此四符遇胎衣不出以朱砂書吞下

謹按前所著方論圖向符訣一帙自夫人泛視之似為迂遠然艱於得子者恒相質問則惟此書為要屢試有明驗也余每觀其護孕之方極為曲當易產之藥悉有根據至於圖向之趨避吉凶所關符訣之玄微神妙顯用其誠有得於諸先哲者乎不然王太僕諸公深於奧理者也豈謬論耶則是書也誠妊娠良方家戶之所當

珍藏考究者使舍此而施治於妊婦鮮不有誤矣觀者
勿以為迂遠云



薛氏醫案卷四十

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷四十一至
三

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官助教臣卜維吉

謄錄監生臣袁 瑩

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四十一

明 薛己訂

婦人良方

產難門

坐月既明須知
產難故以次之

產難論第一

婦人以血為主惟氣順則血和胎安則產順今富貴之家過於安逸以致氣滯而胎不轉動或為交合使精血

聚於胞中皆致產難若腹或痛或止名曰弄胎穩婆不
悟入手試水致胞破漿乾兒難轉身亦難生矣凡產直
候痛極兒逼產門方可坐草時當盛暑倘或血運血溢
當飲清水解之冬末春初產室用火和煖下部衣服尤
當溫厚方免胎寒血結若臨月洗頭濯足亦致產難

愚按丹溪先生曰余族妹苦於產難遇胎則驅之于
甚憫焉蓋其形肥而勤女工形肥則氣虛久坐則氣
不運而兒在胞胎因亦不能自運耳當補其母之氣

則免健易產故後有孕至五六月遂以紫蘇飲加補
氣藥與之數十貼而產甚快大要在隨母之稟性若
胎胞破早血水先乾或難產勞傷氣血者煎八珍湯
或十全大補湯加益母草不時與服以協濟之或以
黃芪數觔芎歸四五觔許大釜水煎藥氣氤氳滿室
使產婦口鼻俱受其氣臍帶以油紙撚燒斷補接其
陽氣穩婆須擇老練者當先施惠預說與知倘有生
息不順只說是未產或是雙胎只說胎衣未下恐驚

則氣散愈難生息

附治驗方藥

荆婦孟冬分娩艱難傷勞元氣產子已死用油紙搥
燒斷臍帶藉其氣以煖之俄頃忽作聲此兒後無傷
食作瀉之症可見前法之功不誣世用刀器斷臍帶
子母致危者竟不知其由矣且穩婆又喜平日常施
小惠得其用心兼以安慰母懷故無虞耳一穩婆云
我止有一女正分娩時適當巡街侍御行牌取我視

其室分娩女用驚赫未產而死後見侍御更以威顏
分付迨視產母胎順而頭偏在一邊以致難產因畏
其威不敢施手由是其母子俱不能救

紫蘇飲

方見十二
卷第八論

十全大補湯

八珍湯

二方見二十
四卷第四論

楊子建十產論第二

凡生產先知此十証庶免子母之命折於無辜也世之

收生者少有精良妙手多致傾命予因傷痛而備言之

一曰正產

正產者言懷胎十月陰陽氣足忽然作陣疼痛胎至谷道漿破血下兒即正產

二曰傷產

傷產者言懷胎未足月有所傷動以致忽然臍腹疼痛或服催藥過早或產母努力太早逼兒錯路不能正生凡分娩須待兒身轉順頭對產門努力一送兒即正生

三曰催生

催生者言欲產時兒頭至產門方服藥催之或經日久產母困倦難生宜服藥以助其血氣令兒速生

四曰凍產

凍產者言天氣寒冷產母血氣遲滯兒不能速生故衣裳宜厚產室宜煖背心亦宜溫和庶兒易生

五曰熱產

熱產者言盛暑之月產婦當溫涼得宜熱甚產母則頭

疼面赤昏暈若產室人衆熱氣蒸逼亦致前患名曰血暈若夏月風涼陰雨亦當謹避

六曰橫產

橫產者言兒方轉身產母用力逼之故也凡產母當令安然仰卧穩婆先推兒身順直頭對產門以中指探其肩不令臍帶羈扳方用藥催之繼以產母努力兒即生

七曰倒產

倒產者言兒未能轉身產母努力故也當令產母仰卧

穩婆推入候兒自順若良久不生令穩婆手入產戶一
邊撥兒轉順近產門却服催藥并努力即下

八曰偏產

偏產者言兒回身未順生路產母努力逼兒頭偏一邊
產雖露頂非也乃額角耳當令產母仰卧穩婆輕手正
其頭向產門却令產母努力子即下若兒頂後骨偏挂
穀道露額令穩婆以綿衣灸煖裹手於穀道外傍輕手
推正令產母努力兒即生

九曰礙產

礙產者言兒身已順門路已正兒頭已露因兒轉身臍帶絆其肩以致不能生令產母仰卧穩婆輕推兒向上以中指按兒肩脫臍帶仍令兒身正順產母努力兒即生

十曰坐產

坐產者言兒之欲生當從高處牢繫手巾一條令產母以手攀之輕輕屈坐令兒生下不可坐抵兒生路

十一曰盤腸產

趙都運恭人每臨產則子腸先出然後產子其腸不收名曰盤腸穩婆以醋水各半盞默然喫產婦面背才收不可不知

愚按前症古方以草麻子仁四十九粒研塗產母頭頂腸收上急洗去其腸若乾以磨刀水少許溫潤之再用磁石煎湯服之即收上磁石須陰陽家用有驗者若以水喫母面背恐驚則氣散

治盤腸產以半夏為末搐鼻中腸自上

又方大紙摺以麻油潤燈吹滅以煙薰產婦鼻中腸即上

又方腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之腸即上

催生方論第三

五行論命以年月日時支干五行相生相值以推其貴賤其間最切要者時也得其時則終身富貴失其時則一世貧賤然則命稟於有生之初豈可催乎世之催生

之說蓋為產難而設也今開歷驗數方于後

催生柞木飲子 治產難或胎爛腹中腹悶其效如神

生柞木

一尺對

甘草

大者五寸對五段

右用水三鍾紙封罐口煎一鍾半候胎順產門徐徐
溫服即時分娩更無諸苦切不可早於坐草及穩婆
下手催逼

催生如神散 治逆產橫生其功甚大

百草霜 白芷

不見火各為末等分

右每服三錢至胎順產門以童便米醋和如膏加沸湯調下或童便酒煎進二服然血得黑則止此藥大能固血又免血乾甚妙

如聖散用黃蜀葵花焙為末熱湯調下二錢若漏血胎胞乾澁難產併進三服即產如無花用葵子末半合調溫酒服尤妙若打撲胎死紅花酒調下

順生丹 治症同上

兔腦髓

去皮膜
研如膏

明乳香

一兩
細研

母丁香

末二兩

麝香

一錢
細研

右以兔腦髓丸雞頭大陰乾每服一九溫水下男左

女右手握出

兔腦臘月者尤佳

又方通明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用冷水醋

少許調服扶立令兩手拿石燕二箇念醫靈藥聖三

遍行數步坐草便生更無痛楚神效

愚按前法觀之似迂其用者云甚驗

治產不順

蛇蛻

一條全者

蠶蛻紙

一張無則一方

右入新瓦瓶內鹽泥固濟存性為末煎榆白皮湯下
一錢三服覺痛便生

又方用伏龍肝研末每服一錢酒調下兜頭戴土而下
又方吞槐子十四粒即下

又方當歸為末酒調一錢服良久再服

一方用魚膠一尺許新瓦上煨灰陳醋調服立下

又方大朱砂於端午日晒起以百日為度研為細末用
臘月兔腦髓丸綠豆大欲產時粥飲下一丸良久便

生其藥男左女右手中握出晒硃砂不得着雨

又方臘月兔頭煨為末葱白煎湯調二錢立生或臘月
兔血紙袋盛掛當風處陰乾為末煎乳香湯調下二
錢或兔皮和毛燒為末酒調服二錢即產如胎衣未
下再服

神妙乳砂丹用明乳香為末臘月兔血九桐子大硃砂
為衣陰乾每服二九嚼碎冷酒下良久未生再服○
難產以蓮葉蒂七箇水煎化服二九良久未生再服

○胞漿先乾胎不得下急服大料四物湯滋其血氣
並濃煎葱湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却服前
藥○胎死不出用朴硝五錢滾湯調下或平胃散一
服胞衣未下酒水服一九○橫逆不順先用如神散
方見前產門不開用加味芩歸湯仍服二丸須月初上
辰日修合鹽塗兒足底急搔摩之即產

應急方 好墨新汲水濃磨服之墨水裹兒出

又方清油同蜜等分入滾湯少許調服或油煎一盞服

之或路傍破草鞋一隻取鼻絡小繩燒灰酒調服

交骨不開產門不閉方論第四

新附

竊謂交骨不開產門不閉皆由元氣素弱胎前失於調攝以致血氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芩歸湯補中益氣湯產門不閉氣血虛也用十全大補湯

附治驗

地官李孟卿娶三十五歲女為繼室妊娠慮其難產

索加味芎歸湯四劑備用果產門不開止服一劑
頓然分娩

上舍懷德之室產門不開兩日未生服前藥一劑即
時而產懷德傳服此方用者無有不驗

一婦人分娩最易至四十妊娠下血甚多產門不開
與前湯一劑又以無憂散勸許煎熱時時飲之以助
其血而產

一產婦陰門不開發熱惡寒用十全大補加五味子

數劑而寒熱退又用補中益氣加五味子數劑而陰
戶斂若初產腫脹或坼痛而不閉者用加味逍遙散
若腫既消而不閉者用補中益氣湯切忌寒涼之劑
一婦人脾胃素弱兼有肝火產後陰門腫痛寒熱作
渴嘔吐不食敷大黃等藥服驅利之劑腫及於臀虛
症蜂起此真氣虛也先用六君子以固脾胃乃以補
中益氣湯升舉而消

一產婦失治腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒暮

熱自汗盜汗半年矣余用補中益氣加茯苓半夏以健脾胃膿水漸少飲食漸進用歸脾湯以解脾鬱共五十餘劑元氣復而瘡亦愈矣

一產婦陰門不閉小便淋瀝腹內一物攻動脇下或脹或痛用加味道逍遙散加車前子而愈

一婦人子宮腫大二日方入損落一片殊類猪肝面黃體倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸症悉愈仍復生育

加味芎歸湯 治交骨不開不能生產

川芎

當歸

各一兩

自死龜板

一酥

一箇

婦人頭髮

一握燒存性

右為散每服五錢水煎服約人行五里即生如胎死亦下灼過龜板亦可

十全大補湯

方見二十四卷第四論

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

郭稽中產難方論第五

論曰產難者因兒轉身將兒枕血塊破碎與胞中敗血

壅滯兒身不能便利是以難產急服勝金散消散其血使兒自易生陳無擇云多因兒未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而血水乾產路澁而兒難下宜先服催生如神散以固其血設或逆生橫產當用前法針刺之

勝金散

麝香末一錢 豆豉一兩

右每服一錢用秤錘燒赤淬酒下催生如神散亦可

用

產難子死腹中方論第六

產難子死腹中多因驚動太早或觸犯禁忌其血先下胎乾涸而然也須驗產母舌若青黑其胎死矣當下之故產室坐卧須順四時方向并遵五行避忌則吉

附治驗

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢余意其胎已死今視其舌青黑與朴硝半兩許

服之化下穢水而安

一婦人胎死服朴硝下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君子為主佐以四物薑桂調補而愈

一方水銀半兩桂末一錢作一服溫酒調下粥飲亦可
又方以利斧煨赤置酒中待溫飲之其子便下

又方以錫粉水銀各一錢棗肉丸大豆許水吞下立出
又方朴硝三錢溫童便調下猫犬牛畜用之皆驗

又方平胃散五錢酒水各一盞煎至一盞投朴硝五錢

再煎三五沸温服其胎即化水而出寶慶方云凡欲
斷臍帶先以繫物墜下後可斷之否則胞衣上即冲
心而死

附方

四君子湯

四物湯

二方見二十四卷第六論

產難生死訣第七

欲產之婦脉離經

難經云一呼三至曰離經此是陽加於陰一倍也一呼一至亦曰離經此是陰加於陽四倍也註云經者常也胃脉離常絡之處周即言之一呼脉再至一吸脉再至曰脾和之脉故一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸一日一夜一萬三千五百息脉行八百一十丈乃于一周復從始之經再行今一呼脉三至一吸脉三至呼吸定息脉行九寸一日一夜脉行通計一千二百一十五丈過於平脉之數不

在所起之經再起故曰離經若一呼一至脉行寸半一吸一至脉行寸半呼吸定息脉行三寸一日一夜通計脉行得四百單五丈乃謂一周是不足平脉之數周而復始亦不在所起之經再起亦曰離經也

沉細而滑也同名

臨產之婦脉見沉細而滑者乃腎臟本脉之形然腎繫胞胎見此脉者亦與離經之脉同名也

夜半覺痛應分誕來日午定知生

若妊婦夜半時覺腹痛定知來日午時當分娩也聖
惠方云夜半子時覺腹痛來日午時必定生產謂子
午相半正半日觀數也

身重體熱寒又頻舌下之脉黑復青反舌上冷子常死
腹中須遣子歸冥

凡妊婦身有沉重者胃氣絕也又體熱寒臑頭併者
王氣衰陰氣盛也若舌捲下脉青黑色也及舌反捲
上水冷不溫者子母俱死之候

面赤舌青細尋看母活子死定應難

凡妊婦面色亦是榮氣流通母活之候舌上青色是
妊脉絡絕胎死之候

唇口俱青沫又出子母俱死總高判

若妊婦唇口俱青色者榮衛氣絕也又口中吐出痰
沫者是脾胃之氣俱絕此是子母俱死之候也

面青舌青沫出頻母死子活是知真不信若能看應驗
尋之賢哲不虛陳

凡妊婦面與舌皆青色又吐痰沫者是產婦榮衛俱絕胎氣衝上之候此是子活母死之候產下子母必死也此古賢哲應驗之文不虛妄陳其說也

新產之脉緩滑吉實大弦急死來侵

凡婦人新產之後其脉來緩滑者為氣血通利調和是生活安吉之兆也若見牢大弦急之脉則凶必死之脉也

若得沉重小者吉忽若堅牢命不停

若產婦診得沉重微小者此是形虛相應故云吉兆
之脉忽然診得堅硬牢實之脉是脉盛形衰相反性
命不可停留必死也

寸口澁疾不調死

若產後寸口脉澁疾大小不調勻者此是血氣衰絕
之脉故云死也

沉細附骨不絕生

若重手按之乃得其脉沉細附着於骨不斷絕有力

者此生活之兆也

審看此候分明記長須念此向心經

凡為醫者宜詳審脉証分明記於心膏也

愚按前論與脉訣刊誤所云不同觀者審之

薛氏醫案卷四十一

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四十二

明薛已訂

婦人良方

產後門

產難既明須知產後疾病故以次之

產後將護法第一

婦人產畢飲熱童便一盞閉目少坐上床倚故立膝仰
卧不時喚醒及以醋塗鼻或用醋炭及燒漆器更以手

從心擗至臍下使惡露不滯如此三日以防血暈血逆
酒雖行血亦不可多恐引血入四肢且能昏暈宜頻食
白粥少許一月之後宜食羊肉猪蹄少許仍慎言語七
情寒暑梳頭洗足以百日為度若氣血素弱者不計日
月否則患手足腰腿痠痛等症名曰蓐勞最難治療初
產時不可問是男女恐因言語而泄氣或以愛憎而動
氣皆能致病不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣
不可刷牙恐致血逆須血氣平復方可治事犯時微若

秋毫成病重如山嶽可不戒哉

產後調理法第二

產後將息如法臟腑調和庶無諸疾苦須先服黑神散
四物湯四順理中丸七寶散若壯熱頭痛此乳脉將行
用玉露散頭目不清是血暈用清魂散粥食不美是胃
氣虛用四順理中丸

愚按丹溪先生云肉汁發陰經之火易成內傷之病
當歸丸當歸建中湯四順理中丸雖滋補悉犯桂附

乾薑僭熱之劑臟腑無寒何處消受若夫兒之初產
母腹頓寬便啖雞子火鹽不思雞子難化火鹽發熱
展轉為病醫者不識妄指他病率爾用藥寧不誤人
予每見產婦之無病者皆不用黑神散與雞子火鹽
諸般肉食每白粥調理間以此小石首魚乾淡食之
至半月以後少食雖雞子亦豁開煮之方能養胃却
痰彼富貴之家嬌姿之婦率有白帶頭風氣痛膈滿
痰逆口乾經事不調髮脫體熱皆因失於調理所致

也

產後通用方第三

愚按前方即產後諸症各門自有方論主治故不再錄

胞衣不出論第四

郭稽中曰胎衣不下者因氣力疲憊不能努出或血入衣中脹大而不能下以致心胸脹痛喘急速服奪命丹血散脹消其衣自下牛膝散亦效

愚按前症若出而氣虛不能入用補中益氣湯或革
麻子仁一兩研塗母頭頂心即上若胎衣不下用革
麻子仁塗右腳心胎衣下急洗之緩則胎衣仍入益
母丸亦效若胎衣未下若欲斷臍帶須先以少物繫
墜然後斷之

附治驗

一婦人胞衣不出胸腹脹痛手不敢近用滾酒下失
笑散一劑惡露胎衣並下

一產婦胎衣不出腹作痛手按痛稍緩此氣虛而不能送出也用無憂散而下前症常詢諸穩婆云宜服益母草丸或就以產婦頭髮入口作嘔胎衣自出其胎衣不出者必死授與前法效

奪命丹

附子

半兩
炮

牡丹皮

一大黃
兩

乾漆

一錢炒
煙盡

右為末醋煎大黃成膏九桐子大溫酒吞五七丸

花蕊石散

治產後敗血不盡血迷血暈腹中胎衣不

下至死心頭煖者急用一服化水即出其效如神

花蕊石斤一上色硫黃

四兩

右和勻先用紙泥封固瓦罐一箇入二藥仍封固陰乾如急用以焙籠內炙乾用炭煨赤去火次日取出細研每服一錢童便熱酒下

牛膝散 治胎衣不出腹中脹急服此藥腐化而下緩則不救

牛膝 川芎 朴硝 蒲黃

各三兩

當歸 桂心

一兩五錢

右每服五錢薑三片生地黃一錢水煎

附方

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

失笑散

方見十六卷第五論

無憂散

方見十六卷第三論

益母草丸

方見十三卷第九論

又方用竈下土三四錢好醋調和納臍中續煎生甘草湯半盞或以醋湯飲之即出

又方用草麻子仁研爛塗足心下即洗去

又方用紅花一兩酒煮濃汁服

又方用鹿角鎊三錢為末煮葱白湯調服

又方取產母鞋底炙熱熨小腹上下二七次

又方用浸苧水濃煮溫飲二碗立下

又方用阜角棘燒為末每服一錢溫酒調

產後血暈方論第五

產後血暈乃血入肝經甚至眼花昏悶用黑神散主之

下血過多用清魂散補之或以醋湯細飲或預燒秤錘以醋沃之或釀醋塗口鼻或燒漆器薰之使產母鼻吸其氣庶無此患

愚按前症若惡露上行用失笑散血下過多芎歸湯若過勞所傷補中益氣湯氣血虛極用清魂散大凡產後口眼喎斜等症當大補氣血為主而兼以治痰若脾胃虛弱用六君子湯苟於七月之前服安胎飲至八九月間加大腹皮黃楊頭元氣虛弱八珍湯臨

產用無憂散則無前患

附治驗

一婦八月胎下墜或動面黃體倦飲食少思此脾氣
虛弱用補中益氣湯倍白朮加蘇梗三十餘劑而安
產後眩暈胸滿咳嗽用四物加茯苓半夏桔梗而愈
一妊婦因產飲酒惡露甚多患血暈口出酒氣此血
得酒熱而妄行虛而作暈也以佛手散加煨甘葛二
錢一劑而痊酒性慄悍入月及產後不宜飲恐致前

症產室人衆氣熱喧攘亦致此症

奪命丹 治血暈腹痛沒藥血竭末等分每服二錢熱

童便熱酒下

牡丹皮散 治產後惡露悶絕

牡丹皮 芒硝

大黃

蒸各一兩

冬瓜仁

三七粒去皮去

右每五錢水煎服

清魂散 治產後氣血暴損虛火妄動血隨火上以致心

神昏亂口噤眼花甚至悶絕而甦

澤蘭葉

人參

各一錢

荊芥

三錢

川芎

一錢

右各另為末和勻每服一二錢熱湯和酒調灌之

當歸芍藥湯

方見十二卷第十二論

一方五靈脂末半生半炒每服二錢溫酒灌入喉即愈

一方荊芥為末童便調

一方神麩末每服二錢熱水調

一方韭菜切入瓶內注熱醋以瓶口對鼻氣入即醒

一方用紅花末五錢酒調服

一方半夏為末九豆大入鼻中即省亦療五絕

一方赤小豆為末東流水和服錢許不瘥再服

佛手散 治產後去血眩暈欲絕

方見十二卷第七論

又方松煙墨二錢燒赤膏減為末溫酒調半匕京墨亦可或燒漆器取煙薰之

附方

失笑散

方見二十卷第五論

補中益氣湯

六君子湯

四物湯

三方見二十
四卷第六論

安胎飲

方見十二
卷第二論

無憂散

方見十六
卷第二論

產後顛狂方論第六

產後顛狂乃敗血上衝用大聖澤蘭散加砂仁末三分煎酸棗仁湯調下或硃砂二錢研細以乳汁調和入紫項活地龍一條滾二三沸去之入酒再用重湯煮溫分三服

愚按前症乃血虛神不守舍非補養元氣不可仍參後各門互用

附治驗

一產婦患前症或用大澤蘭湯而愈後又怔忡妄言其痰甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用八珍散加遠志茯苓養其氣血而瘥

一產婦亦患此用化痰安神等藥病益甚神思消爍余以為心脾血氣不足用大劑參朮芍歸茯苓神酸棗

仁四觔餘而安乃以歸脾湯五十餘劑而愈

附方

隱居澤蘭湯

方見二十卷第六論

茯苓散

方見十九卷第三論

八珍湯

歸脾湯

二方見二十四卷第四論

產後狂言譫語方論第七

產後狂言譫語乃心血虛也用硃砂末酒調下龍虎丹

參九琥珀地黃丸亦可如驚悸歌哭顛狂等症當參十
九等卷治之

愚按前症當固胃氣為主而佐以見症之藥為善若
一於攻痰則誤矣

附治驗

一產婦形體甚倦時發謔語用柏子仁散稍愈又用
加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言脇痛小便下血用
加味道遙散以清肝火養肝血頓瘥又佐以加味歸

脾湯而安

治敗血上衝發熱狂走脉虛大者

乾荷葉 生地黃 牡丹皮

等分

右濃煎湯調生蒲黃二錢服之即止

妙香散 治產後語言錯亂用生地當歸煎湯調服立

効

方見六卷第八論

附方

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

栢子仁散

方見十九卷首論

加味歸脾湯

方見二十四卷第四論

產後不語方論第八

產後不語因心氣虛而不能通於舌則舌強不能言語者宜服七珍散餘當推其所因而治之可也

愚按經云大腸之脉散舌下又云脾之脉是動則病舌本強不能言又云腎之別脉上入于心繫舌本虛則不能言竊謂前症若心腎氣虛用七珍散腎虛風

熱地黃飲大腸風熱加味逍遙散加防風白芷脾經
風熱秦艽升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風白
芷脾氣鬱結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡
加釣藤鈎脾受土侮六君加升麻白芷釣藤鈎肝脾
血虛用佛手散脾氣虛用四君子氣血俱虛八珍湯
如不應用獨參湯更不應急加附子補其氣而生其
血若竟用血藥則誤矣

附治驗

一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱晡熱肢體倦怠飲食不進用加味歸脾湯為主佐以七珍散而愈後因怒不語口禁腰背反張手足發搐或小便見血面色或青或黃或時兼赤余曰面青肝之本色也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加鈎藤鈎茨苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

七珍散

人參 石菖蒲 生地黃 川芎 各一
兩 細辛 一錢

防風 辰砂

別研各半兩

右為末每服一錢薄荷湯調

胡氏孤鳳散 治產後閉目不語用生白礬末每服一

錢熱水調下

治產後不語

人參 石蓮肉

不去心

石菖蒲

等分

右每服五錢水煎

附方

地黄飲

方見三卷
第四論

加味逍遙散

加味歸脾湯

八珍湯

三方見二十
四卷第四論

秦艽升麻湯

方見三卷
第一論

清肝散

方見二十四
卷第三論

小柴胡湯

方見二十四
卷第二論

六君子湯

四君子湯

二方見二十四卷第六論

佛手散

方見十二卷第七論

獨參湯

方見三卷第十三論

薛氏醫案卷四十二

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四十三

明薛已訂

婦人良方

產後乍見鬼神方論第一

產後如見鬼神或言語譫妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之愚按前症若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八

珍加炮薑若心血虛損用柏子仁散大抵此証皆心
脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果
係鬼祟所附即灸鬼哭穴可愈其或不起者多因豁
痰降火攻伐之過也

仍參第三卷產後譫
語乍見鬼神方論

附治驗

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散益
甚痰涎上湧朝寒暮熱余朝用八珍散夕用加味歸
脾湯各五十餘劑而愈

調經散 治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時見怪

沒藥

琥珀

並細研

桂心

各一錢

芍藥

炒

當歸

各一錢

細辛

五分

麝香

少許

右為末每服五分薑汁溫酒各少許調服下即愈

柏子仁散

治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語

柏子仁

遠志

人參

桑寄生

防風

琥珀

另研

當歸

炒

生地黄

焙

甘草

炒等分

右用白羊心一箇水三盞煮清汁七分入藥五錢煎

服

附方

八珍湯

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

鬼哭穴

方見六卷第八論

產後心神驚悸方論第二

產後心神驚悸恐懼或目睛不轉口不能言乃心氣虛而六淫內侵診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱

則為悸矣

愚按人之所主者心心之所主者血心血一虛神氣不守此驚悸所由作也當補血氣為主

仍參三卷第十論

附治驗

一產婦患前症二度服琥珀地黃丸局方妙香散隨効再患服之其症益甚而脉浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱虛余用十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

琥珀地黄丸 治產後惡露未盡胸腹作痛或小便不

利

琥珀

另研

延胡索

糯米同炒赤去米

當歸

各一兩

蒲黃

四兩炒香

生地黄

研取汁留滓

生薑

各二斤研取汁留滓生薑汁用銀石器內炒地黄滓以地

黃汁炒生薑滓各乾為末

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛等症

辰砂

另研琥珀

沒藥

並研當歸

為末等分

右為末每服二錢空心日午臨卧用白湯調下
產後驚悸亂語精神不定用好硃砂為細末酒調服錢

許

附方

局方妙香散

方見三卷
第十三論

茯苓補心湯

方見三卷
第十論

十全大補湯

加味歸脾湯

二方見二十
四卷第四論

產後中風心驚方論第三

產後眼張口噤肢體強直腰背反偃言語錯亂如癇者此氣虛風邪所傷而成瘕也

愚按仲景先生云有汗為柔瘕用桂枝湯無汗為剛瘕用麻黃湯然產後得此血氣俱虛之敗症也不可與傷寒例看丹溪先生云產後當大補氣血為主可用十全大補湯以補元氣如不應急加附子更不應是藥力弗逮也仍用參附湯多服余常治大虛之症

參芪數劑附子數枚方應

附治驗

一產婦患此不省人事言語妄甚惡風寒喜熱飲形
氣倦怠脉虛浮無力余謂血氣虛寒用十全大補湯
二十餘劑不應又二十餘劑稍緩乃漸加附子至一
錢服數劑諸症減一二又二十餘劑十退三四乃去
附子五分數劑諸症頓退而安後又發仍服前藥加
附子三五分而愈

茯苓散 治產後心虛忪悸言語錯亂健忘少睡或自

汗盜汗

人參

甘草

炒

芍藥

炒

當歸

生薑

各八分

遠志

去心

茯苓

各一錢

桂心

六分

麥門冬

去心五分

大棗

二枚

右水煎服

抱膽丸

治產後遇驚發狂或遇經行發狂

水銀

二兩

黑鉛

一兩五錢

硃砂

一兩

乳香

一兩 另研

右將黑鉛入銚內火鎔下水銀結成砂子下硃砂乳香

末乘熱用柳木槌研勻丸雞頭子大每服一九空心
薄荷湯下得睡勿驚覺來即安妙香散亦善

附方

妙香散

方見三卷
第十三論

十全大補湯

方見二十四
卷第四論

參附湯

方見後
第六論

產後中風恍惚方論第四

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以致心

神恍惚怔忡不寧

愚按前症當大補血氣為主而佐以後方為善蓋風乃虛極之假象也固其本源諸病自退若專治風則速其危矣

附治驗

一產婦患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽緊兩

唇抽動小便自遺余謂肝火熾盛用十全大補加鈞藤山梔而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸 治產後中風驚狂起卧不安或痰涎上

湧

石菖蒲

遠志

去骨蘆
甘草煮

人參

茯神

去木

辰砂

各三錢

川芎

山藥

鐵粉

麥門冬

去心細辛

半夏

湯泡

天麻

南星

白附子

各一兩

右為末薑汁糊丸菜豆大別以硃砂為衣每服三十

九臨卧薑湯下

附方

八珍湯

十全大補湯

加味歸脾湯

三方見二十四卷第四論

產後虛極生風方論第五

產後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出目眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣

愚按前症若心脾血氣俱虛用十全大補湯如不應
加附子釣藤鈎若肝經血虛用逍遙散加釣藤經云
脾之榮在唇心之液為汗若心脾二臟虛極急用參
附湯救之

附治驗

一婦人患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸
鳴腹痛余以陽氣虛寒用六君子薑附各加至五錢
不應以參附各一兩始應良久不服仍腸鳴腹痛後

灸關元穴百餘壯及服十全大補湯方效

濟危上丹

乳香

研

五靈脂

硫黃

玄精石

同研
極細

阿膠

卷柏

桑寄生

陳皮

等分

右將上四味入石器內微火炒再研入餘末用生地

黃汁九桐子大每服二十九食前溫酒或當歸酒下

當歸建中湯 治產後腹痛拘急痛連腰背自汗少食

當歸

桂心

各三兩

白芍藥

六兩炒
焦黃

甘草

二兩

右每服五錢薑棗水煎入飴糖一匙服如未應加之

附方

參附湯

方見本
卷後

十全大補湯

逍遙散

二方見二十
四卷第四論

六君子湯

方見二十四
卷第六論

獨參湯

治一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤痰

鳴自汗盜汗或氣虛脉脫手足逆冷蓋血生於氣故

血脫補氣陽生陰長之理也

方見三卷第十三論

產後虛汗不止方論第六

產後汗不止者皆由陽氣頓虛腠理不密而津液妄泄也若遇風則變痙縱虛乏短氣則身體消瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

愚按前症屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應用參附芪附等湯若汗多亡陽發痙尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至頸而還額上偏多蓋額為六陽

之所會也由虛熱薰蒸而出竊謂前症當以部仕分
之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心治
者審之

仍參三卷
第六論

附治驗

一產婦畧聞音響其汗如水而昏憤諸藥到口即
嘔余以為脾氣虛敗用參附末為細丸時含三五粒
隨液嚥下乃漸加之至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂至廢寐神思疲甚口乾引飲余

謂血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩連柏炒黑倍加人參五味子二劑而愈麻黃根湯 治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

當歸

麻黃根

牡礪

蝦為粉

人參

甘草

炒等分

右每服四錢水煎

一方 治產後自汗盜汗胃氣虛弱服別藥則嘔吐不能入

當歸

黃芪

各一兩

麻黃根

二兩

右每服三錢水煎

治產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸

甘草炙一兩附子炮五錢桂心芍藥炒各一兩半

右每服三錢薑棗水煎服虛甚更加以效為度

止汗散

牡礪為末半兩小麥麩八兩炒黃為細末

右每服三五錢用猪肉汁調

人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等症

人參 當歸

等分

右為末以猪腰子一枚切片水二鍾糯米半合葱白二根煮取汁八分入藥三錢煎服

附方

當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不止不應加人參白朮心血不足加酸棗仁炒

當歸

熟地黄自製黃芪

炒各二錢

生地黄

黃柏

炒黑

黃芩

炒黑

黃連

炒黑

各一錢

右水煎服

參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便
自利或臍腹疼痛吃逆不食或汗多發瘧等症

人參

兩一

附子

錢五

五

湯
右作一服薑棗水煎徐徐服去人參加黃芪名芪附

當歸補血湯 治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜
不息脉洪大而虛重按全無者

當歸

三錢

黃芪

炙一兩

右水煎服

十全大補湯

方見二十四卷第六論

芪附湯 治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰湧四肢逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等症

黃芪

一兩

附子

炮五錢

右作一劑薑棗水煎服如不應倍加附子方得全濟

產後冒悶汗出方論第七

產後忽冒悶汗出者因陰血虧損陽氣鬱暴故也急吞鷄子三枚未醒飲童便或時復發宜服竹瀝五合

愚按前症屬大虛宜固元氣為主其汗不止必變柔痙東垣先生云婦人分娩及半產漏下昏冒目瞑蓋因血暴亡而火上熾但補其血則神自昌若常時血下當補而升舉其氣陽得血而神安則目明矣今立一方以補手足厥陰之血兼益陽氣名曰全生活血

湯

全生活血湯 治發熱自汗盜汗目眩四肢無力口

乾頭暈行步欹側

柴胡

當歸

各二錢

生地

炒熟

地黃

各一錢

川芎

藁本

各一錢半

防風

羌活

獨活

葛根

甘草

各二錢

細辛

五分

蔓荊子

五分

升麻

芍藥

各三錢

紅花

三分

右每服五錢水煎熱服

產後汗多變痙方論第八

產後汗多變痙因氣血虧損肉理不密風邪所乘其形

口噤背強如癇或搖頭馬嘶不時舉發氣息如絕宜速
灌小續命湯若汗出兩手拭不及者不治

愚按前症因去血過多元氣虧極或外邪相搏以致
牙關緊急四肢痙強或陰火內動或腰背反張肢體
抽搐若有汗而不惡寒者曰柔痙若無汗而惡寒者
曰剛痙血亡過多筋無所養故傷寒汗下過多潰瘍
膿血大泄多患之乃敗症也急以十全大補湯治之
如不應急加附子多有復甦者亦有六淫七情所致

者治法見第三卷第三論

附治驗

一產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄此去血過多元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮薑一劑而甦數劑而安

余在吳江史萬湖第時將入更聞喧攘詢云家人婦產後出直廚忽仆而死余意其勞傷血氣而發瘕也急用十全大補加附子煎滾令人正其面開其口灌

之久不能下令側其面而出之換以熱藥如此五次
方得下咽遂甦

小續命湯 治剛瘕或脚氣痺弱不能轉舒行步欹側
或口眼喎斜牙關緊急角弓反張

麻黃 桂心

甘草

各半兩

防風

三兩

芍藥

炒

白朮

炒

人參 川芎

附子

炮

防已

酒拌

黃芩

炒

各等分

右每服五錢水煎入薑汁少許溫服若自汗為柔瘕
去麻黃有熱去附子減桂一半盛冬初春去黃芩

十全大補湯

方見二十四卷第四論

產後口噤腰背反張方論第九

產後口噤由血氣虛而風邪乘於手三陽經也蓋手三陽之筋循結於頷得風冷則筋急故致口噤腰背攣急角弓反張者是風邪入於諸陽之經也

愚按前症因氣血耗損腠理不密汗出過多而患之者乃虛象也宜固氣血為主佐以本方丹溪云產後當大補氣血為先雖有他症以末治之如惡寒發熱

等症乃氣血虛甚之極也宜大劑參芪歸朮肉桂以培養之如不應急用炮附子再不應用人參二兩炮附子二三錢名參附湯借猶未應乃藥力未能及也宜多用之

愈風散 治前症用荊芥畧焙為末每服三錢豆淋酒下童便亦可其效如神牙緊灌口鼻

清順散又名交解散

方見第三卷第五論

治婦人產後不省人事吐涎痰

當歸

荊芥穗

等分

右每服三錢水一盞酒少許煎灌下咽即甦愚按前症如有未應者急用大補氣血為主

產後中風白蘇皮一兩或共獨活三兩酒水煎服張仲文用白朮四兩以酒煎頓服

小續命湯

治產後口噤角弓反張

見前

產後中風方論第十

產後中風或血氣未復風寒所感以致筋攣拘急口眼

喎斜或肢體緩弱入臟則恍惚驚悸郭稽中云產後強力下床或誤入房或憂怒內傷臟腑陳無擇曰當以脉辨而治之若努力下床月內入房憂怒受傷非中風類乃蓐勞火邪之症也

愚按前症果外邪所屬形氣不足病氣有餘當補元氣為主稍佐以治病之藥若強力下床月內入房屬形氣病氣俱不足當純補元氣多有復甦者若悞投風藥乃促其危也仍參照第三卷諸論主之

治產後身背拘急妄言發熱四肢拘攣不時驚悸

川芎

羌活

羚羊角

屑酸棗仁

炒芍藥

炒黃各

四兩

桑白皮

分六防風

分五

右水煎分三服

治產後中風唇青鼻黑用小續命湯連進三服即愈

產後中風煩渴用紅花子

五合炒研

水煎徐呷之

獨活寄生湯 治前症亦良仍與第三卷中風類通看

後方見

產後四肢筋攣方論第十一

產後中風筋脉攣急乃血氣俱虛或風邪客於皮膚則
頑痺羸乏若入於筋脉則四肢攣急皆由大經空虛風
寒乘虛而漸入也

愚按肝屬木而主筋前症若肝經風熱血燥用加味
逍遙散如不應當用六味地黄丸以補腎水經云風
客淫氣精乃亡邪傷肝也仍參第三卷諸論主之

附治驗

一產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而自熱也
用十全大補湯而安

一產婦手麻服愈風丹遍身皆麻神思倦怠余謂氣
血虛弱用十全大補加炮薑數劑漸愈去薑又數劑
及逍遙散而痊

治產後氣血不足風邪所襲肢節攣痛背項強直

防風

一兩

赤芍藥

炒

桂心

各半兩

羚羊角

兩

川芎

羌活

羌活

羌活

羌活

當歸

酸棗仁

炒

牛旁子

炒

各

三錢

各

右每服四錢水酒煎

愚按前方如未應當用八珍湯更不應用十全大補湯
湯

加味逍遙散

十全大補湯

二方見二十四卷第四論

六味地黃丸

方見二十四卷第十一論

產後痲癡方論第十二

新附

竊謂痲者筋脉拘急也癡者筋脉張縱也經云肝主筋

而藏血蓋肝氣為陽為火肝血為陰為水前症因產後
陰血去多陽火熾盛筋無所養而然耳故癰疽膿水過
多金瘡出血過甚則陽隨陰散亦多致此治法常用八
珍散加丹皮釣藤以生陰血則陽火自退諸症自愈如
不應當用四君芎歸丹皮釣藤以補脾土蓋血生於至
陰至陰者脾土也故小兒吐瀉之後脾胃虧損亦多患
之乃虛象也無風可逐無痰可消若屬陽氣脫陷者用
補中益氣加薑桂陽氣虛敗者用十全大補加桂附亦

有復生者此等症候若肢體惡寒脈微細者此為真狀
若脈浮大發熱煩渴此為假象惟當固本為善若無力
抽搐戴眼反折汗出如珠流者皆不治

附治驗

一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸肢體痿軟汗
出如水余謂前藥辛香耗散真氣腠理虛而津液妄
泄也先用十全大補湯加五味子補實腠理收斂真
氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸愈用逍遙散

大補湯調理而痊

一產婦先胸脇乳內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺左三部脉弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養筋先用加味逍遙散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸諸症悉愈

一婦人發瘕遺尿自汗面赤或時面青飲食如故肝脉弦緊余曰此肝經血燥風熱名瘕也肝主小便其色青入心則赤法當滋陰血清肝火遂用加味逍遙

散不數劑諸症悉退而安

附方

海藏愈風湯一名舉卿古拜散 治一切失血筋脉緊急
產後與汗後搐搦

荆芥為細末

右先以炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取清汁調前
末三五錢和滓飲之輕者一服重者二三服中病即
止其效如神氣虛者忌服一方用童便調下本事方

云此藥委有奇效神靈之功大抵產室無風為佳不可衣被帳褥太煖太煖即汗出汗出則腠理開易於中風便昏冒一婦人產後遮護太密更生旺火睡久及醒則昏昏如醉不省人事用此藥佐以交加散服之即睡睡中必以左手搔頭覺必醒矣良久果驗

交加散 治瘕癥或顫振或產後不省人事口吐痰涎

當歸 荆芥穗

等分

右為細末每服二錢水一盞酒少許煎至七分瀝下

神效

增損柴胡湯 治產後或經適斷致手足牽搐咬牙昏

胃異症

柴胡

八錢

黃芩

炒四錢

人參

半夏

各三錢

石膏

四錢

知母

二錢 黃芪

炒五錢

甘草

炙二錢

右為粗末每服半兩薑五片棗四枚水煎溫服

四君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

產後脚氣方論第十三

論曰產後脚氣因元氣內虛六淫外侵所致其狀發熱
瞽悶搖掣驚悸心煩嘔吐氣上用小續命湯治之若以
為敗血攻之則誤矣

愚按前症當補氣血為主佐以小續命湯寄生湯如
不應用大防風湯仍參第一卷九論主之已上十一
症誠似小兒慢驚風無風可逐無痰可清但專補元
氣庶保其生

附治驗

一產婦患前症或用獨活寄生湯而症後復作服之
其汗如水更加口噤吐痰余用十全大補湯培養血
氣漸愈後飲食日少肌體日瘦吐痰如湧此命門火
衰脾土虛寒用八味丸及加味歸脾湯諸症漸退肌
肉漸生

獨活寄生湯 治風邪內攻兩脛腫痛或緩縱孿痺等

症

方見四卷
第七論

小續命湯

方見前

大防風湯

方見二十四卷第九論

十全大補湯

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

八味丸

方見十五卷第十一論

薛氏醫案卷四十三